

# PROTOCOL D'ACTUACIÓ DAVANT UNA CRISI CONVULSIVA EN CENTRES EDUCATIUS

## 1r PAS: AVALUAR I FER EL MANTENIMENT

- 1 Reconeixeu la crisi: Nin/Adolescent **INCONSCIENT**, **RÍGID** amb **CONVULSIONS** o sense. **CONTROLAU EL TEMPS.**



- 2 Intentau col·locar el nin/l'adolescent de costat, al terra, sense objectes al voltant i, si és possible, en una postura de seguretat. No li poseu res a la boca.



- 3 No intenteu frenar els seus moviments.

## 2n PAS: SI SOSPITAU DE CONVULSIÓ GREU, AVISAU EL 061 I SEGUIU INSTRUCCIONS

1. Manteniu el nin/l'adolescent en una posició de seguretat.
2. **NO DEIXEU MAI EL NIN/L'ADOLESCENT TOT SOL.**
3. Telefonau a Urgències (Tel.: 061) i comuniqueu que es tracta d'una crisi convulsiva i seguiu les instruccions.
4. Cridau els pares o els tutors legals.
5. Encara que no pugueu contactar amb els pares o amb el representant legal, no dubteu d'administrar-li la medicació (deure de socors) seguint les instruccions del 061.



Si persisteix la crisi més de 5 minuts, administreu-li un dels fàrmacs disponibles:

**Buccolam®**



Lleu el tap de la xeringa precarregada.  
VIA BUCAL: injectau la dosi entre les dents i la galta.  
Dosi:  
Blava: 5 mg d'1 a 5 anys  
Morada: 7,5 mg de 5 a 10 anys  
Taronja: 10 mg de 10 a 18 anys

**Stesolid®**



Rompeu la llengüeta.  
VIA RECTAL  
Dosi:  
Menys de 20 kg: 5 mg  
Més de 20 kg: 10 mg