


PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ANTE UNA CRISIS CONVULSIVA EN CENTROS EDUCATIVOS

1.er PASO: EVALUAR Y HACER EL MANTENIMIENTO

- 1 Reconozca la crisis: Niño/Adolescente **INCONSCIENTE**, **RÍGIDO** con o sin **CONVULSIONES**. **CONTROLE EL TIEMPO**.



- 2 Intente colocar al niño/adolescente de lado, en el suelo, sin objetos alrededor y, si es posible, en una postura de seguridad. No le ponga nada en la boca.



- 3 No intente frenar sus movimientos.

2.º PASO: SI SOSPECHA DE CONVULSIÓN GRAVE, AVISE AL 061 Y SIGA INSTRUCCIONES

1. Mantenga al niño/adolescente en una posición de seguridad.
2. **NO DEJE NUNCA AL NIÑO/ADOLESCENTE SOLO.**
3. Llame a Urgencias (Tel.: 061). Comunique que se trata de una crisis convulsiva y siga instrucciones.
4. Llame a los padres o a los tutores legales.
5. Aunque no pueda contactar con los padres o con el representante legal, no dude en administrarle la medicación (deber de socorro) siguiendo instrucciones del 061.



Si persiste la crisis más de 5 minutos, adminístrele uno de los fármacos disponibles:

Buccolam®



Quite el tapón de la jeringa precargada.
VÍA BUCAL: inyecte la dosis entre los dientes y la mejilla.

Dosis:

Azul: 5 mg de 1 a 5 años
Morado: 7,5 mg de 5 a 10 años
Naranja: 10 mg de 10 a 18 años

Stesolid®



Rompa la lengüeta.
VÍA RECTAL

Dosis:

Menos de 20 kg: 5 mg
Más de 20 kg: 10 mg