



CIRURGIA ORTOGNÀTICA

La cirurgia ortognàtica permet tractar les deformitats dentofacials, és a dir, reparar les alteracions de la posició dels ossos de la cara i de les dents. L'objectiu és corregir les dificultats per mossegar o respirar i les asimetries facials, a més de millorar l'estètica facial i l'aspecte del somriure.

Abans de l'operació

És fonamental el tractament previ amb un ortodontista, ja que és molt important seguir les indicacions que doni i mantenir una higiene rigorosa per tenir les genives i les dents sanes.

Després de l'operació

- És normal la inflamació durant els primers dies i també són molt freqüents les alteracions de la sensibilitat de la cara i dels llavis. Depèn de si us han operat el maxil·lar superior i l'inferior o només un, i de si a més ha estat necessari corregir el mentó.
- Per pal·liar aquests efectes us prescriurem certa medicació i us aconsellarem que us apliqueu gel a la cara. El postoperatori és molest, però no dolorós.
- Generalment el pacient surt de la sala d'operacions amb la boca blocada per mitjà d'unes gomes elàstiques i amb una fèrula fixada a les dents.
- Malgrat això podreu menjar, al començament dieta líquida o triturada; us donarem indicacions per fer-ho amb una canya o una xeringa.
- L'estada hospitalària no sol ser gaire llarga: en pocs dies rebreu l'alta.

Convalescència a casa

- Durant les primeres setmanes, la dieta continuarà essent triturada.
- Haureu d'acudir a la consulta de l'Hospital per fer-vos revisions i també al vostre ortodontista perquè us vagi canviant progressivament les gomes per unes altres de més fluixes i us faci ajustaments si cal.